

Orientierungstabelle für die COVID-Impfung nach STIKO

Stand 19.11.2021 (Diese Tabelle ersetzt nicht die fortlaufende Kenntnisnahme der STIKO-Empfehlungen, www.rki.de/stiko)

Impfstoff (Typ, Anbieter)	Altersgruppe nach STIKO Empfehlung	Abstand Zweit- zur Erstimpfung	Auffrischung
Comirnaty® (mRNA, BioNTech)	Ab 12 Jahren	3 - 6 Wochen	Auffrischung mit mRNA-Impfstoff nach 6 Monaten*, *** Bei schwer Immunsupprimierten bereits ab 4 Wochen möglich (<i>Details siehe Epidem. Bulletin</i>)
Spikevax® (mRNA, Moderna)	Ab 30 Jahren	4 - 6 Wochen, ***	s.o.*, ***
Vaxzevria® (Vector, AstraZeneca)	Ab 60 Jahren (Impfstoff kann in D. nicht mehr bestellt werden)	4 - 12 Wochen (am besten 9 - 12 Wochen)	s.o. Auffrischung nur mit mRNA-Impfstoff möglich ***
Heterologe Impfung: Vaxzevria® (Vector, AstraZeneca) plus Comirnaty® oder Spikevax®	Alle Personen mit Erstimpfung Vaxzevria® (Vaxzevria kann in D. nicht mehr bestellt werden)	ab 4 Wochen, ***	s.o. Auffrischung nur mit mRNA-Impfstoff möglich ***
COVID-19 Vaccine Janssen (Vector, J&J)	Ab 60 Jahren	einmalige Impfung ab 4 Wochen Optimierung des Impfschutzes mit einem mRNA- Impfstoff (bei der Optimierung mit dem Impfstoff Spikevax® wird eine Dosis von 0,5 ml (entspricht 100 µg mRNA) verabreicht) ***	nach weiteren 6 Monaten Auffrischung mit einem mRNA- Impfstoff (bei einer weiteren Auffrischung mit dem Impfstoff Spikevax® (nach 6 Monaten) werden 0,25 ml (entspricht 50 µg mRNA) verabreicht) ***
Infektion: einmalige Impfung ausreichend In der Regel ab 6 Monate nach Diagnose (PCR oder AK labordiagnostisch), ab 4 Wochen nach Abklingen der Symptome möglich			Derzeit keine Auffrischimpfung empfohlen**
Erst Impfung und danach Infektion		Zweite Impfung *** in der Regel 6 Monate nach Ende der COVID-19-Symptome bzw. nach der Diagnose; ab 4 Wochen nach dem Ende der Symptome möglich.	Derzeit keine Auffrischung empfohlen**
COVID-19 Vaccine Janssen und danach Infektion			Derzeit keine weitere Impfung empfohlen**
Nicht in der EU zugelassener Impfstoff (z.B. Sputnik®)		Um den EU-Status „Geimpft“ zu erlangen, ist eine komplette erneute Impfsérie (mit einem in der EU zu gelassenen Impfstoff) frühestens 28 Tage nach der voran gegangenen Impfung notwendig.	

*Für die Auffrischimpfung soll möglichst der mRNA-Impfstoff benutzt werden, der bei der Grundimmunisierung angewendet wurde. Wenn dieser nicht verfügbar ist, kann auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff eingesetzt werden. Bei unter 30-Jährigen soll nur Comirnaty® eingesetzt werden.
Auffrischungsimpfung mit Spikevax®: 0,25 ml (halbe Dosis der Erst-, bzw. Zweitimpfung) für immungesunde Personen. Bei schwer Immunsupprimierten: dritte Dosis im Rahmen der Grundimmunisierung mit 0,5 ml (entspricht 100 µg mRNA)

**Für Personen, die vor oder nach COVID-19-Impfung eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird derzeit keine Auffrischimpfung empfohlen

*** Bei Impfungen von unter 30-Jährigen mit einem mRNA Impfstoff soll nur Comirnaty® eingesetzt werden.

Wer soll eine Auffrischimpfung bekommen?

Die STIKO empfiehlt derzeit eine Auffrischimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff folgenden Gruppen:

- Personen ab 70 Jahren (ab 18 Jahren, Stellungsverfahren eingeleitet)
- Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen
- Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Einrichtungen
- Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt
- Personen mit Immundefizienz
- Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, zur Optimierung des Impfschutzes

Die **GMK** (05.11.2021) empfiehlt: „Besonders sollten ältere Personen, Menschen mit Vorerkrankungen und medizinisches und pflegerisches Personal sechs Monate nach der Zweitimpfung eine Auffrischimpfung erhalten. Ergänzend können im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und nach ärztlicher Beurteilung und Entscheidung Auffrischimpfungen grundsätzlich allen Personen angeboten werden, die diese nach Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der ersten Impfsérie wünschen.“ Beide mRNA-Impfstoffe sind für eine Auffrischimpfung ab 18 Jahren nach sechs Monaten zugelassen.